

Información importante acerca del tratamiento preventivo con rifampicina

Su prueba de tuberculosis en la piel indica que usted tiene en su cuerpo los gérmenes que causan la tuberculosis (TB). Usted no se siente enfermo porque los gérmenes de la tuberculosis no están activos ahora. Usted no puede contagiar la tuberculosis a otras personas cuando los gérmenes no están activos. Usted tiene una probabilidad de 1 en 10 de que los gérmenes se vuelvan activos en el futuro si no toma este medicamento. Se le ha proporcionado un medicamento llamado rifampicina a fin de evitar que los gérmenes de la tuberculosis se vuelvan activos y hagan que usted se enferme. Siga las instrucciones en esta guía para ayudar a que el medicamento sea lo más efectivo posible para usted.

Tome el medicamento todos los días a la misma hora. Es mejor tomar el medicamento con el estómago vacío.

- Tome el medicamento por lo menos una hora antes de las comidas o por lo menos 2 horas después de las comidas o antes de acostarse. Puede tomar el medicamento con leche, agua, jugo, refrescos, café o té.
- Si el medicamento le causa malestar estomacal, tómelo junto con los alimentos.
- Si está tomando un antiácido (como Maalox o Mylanta), tómelo 1 hora antes o 2 horas después de tomar rifampicina.

Si olvida tomar el medicamento, no trate de tomar dos dosis juntas el día siguiente. Si olvida tomar demasiadas píldoras, el medicamento no será tan efectivo como debiera. Infórmele a la enfermera de tuberculosis si usted no puede acordarse de tomar sus píldoras.

No tome bebidas alcohólicas.

Advertencia:

- El tomar bebidas alcohólicas (vino, cerveza, licor) mientras toma rifampicina puede dañar al hígado.

Infórmele a la enfermera de tuberculosis:

- Acerca de todos los medicamentos que está tomando, lo cual incluye los suplementos alimentarios y herbarios.
- Acerca de cualquier problema o trastorno de salud que tenga.
- Acerca de cualquier alergia que tenga.
- Si usted está embarazada, o si está amamantando.

La rifampicina puede interferir con otros fármacos.

La rifampicina hace que las píldoras anticonceptivas sean menos efectivas. Use otro método anticonceptivo (condones) junto con las píldoras anticonceptivas para evitar el embarazo.

Infórmele a la enfermera si está tomando fármacos para diluir la sangre (como Coumadin). Puede que el médico tenga que cambiar la dosis.

Dígales a los otros médicos que visita que está tomando rifampicina.

La rifampicina es muy segura. La mayoría de las personas no tienen ningún efecto secundario. La rifampicina puede causar una coloración naranja o rojiza en la saliva, el sudor, las lágrimas, la orina o las heces. Esto es normal. La rifampicina puede manchar los lentes de contacto blandos en forma permanente.

Si tiene cualquiera de los siguientes problemas, deje de tomar la rifampicina y llame a la enfermera de tuberculosis al _____ .

Coloración amarillenta de la piel o los ojos

Pérdida del apetito

Retortijones

Fiebre sin una causa conocida

Orina de color oscuro

Cansancio sin motivo

Náusea/vómito

Periodos menstruales más largos de lo normal

Moretones sin causa conocida

Dolor en las articulaciones o calambres en las piernas

Sangrado que toma más tiempo que lo normal en parar

Si alguno de estos problemas le ocurre en fin de semana, por favor llame a su médico de cabecera o acuda a la sala de emergencias. Lleve su medicamento y muéstreselo al médico.